

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA**Rowatinex bels leges oldatos cseppek**

cineol, fenkon, anetol, borneol, camfén, alfa és béta pinén

Miel tt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

- Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy a kezel orvosa, vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelő en szedje.
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szerepl információkra a kés bbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezel orvosát, vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.
- Feltétlenül tájékoztassa kezel orvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Rowatinex bels leges oldatos cseppek (továbbiakban Rowatinex cseppek)és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Rowatinex cseppek szedése el tt
3. Hogyan kell szedni a Rowatinex cseppeket?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Rowatinex cseppeket tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A ROWATINEX CSEPPEK ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A Rowatinex vese- és húgyúti megbetegedések (pl. vesek , vagy a húgyvezetékben lév k és az ezekhez kapcsolódó tünetek) kezelésére, valamint az újbóli k képz és gátlására, továbbá enyhe húgyúti fert zésben a vizeletelválasztás el segítésére szolgáló gyulladáscsökkent és enyhe antibakteriális hatású, simaizmok görcsét oldó gyógyszerkészítmény.

2. TUDNIVALÓK A ROWATINEX CSEPPEK SZEDÉSE EL TT**Ne szedje a Rowatinex cseppeket**

- ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra vagy a Rowatinex cseppek egyéb összetev ire.
- ha májelégtelenségben szenved.
- ha veseelégtelenségben szenved.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Súlyos görcsök, súlyos húgyúti fert zések és a vizeletelválasztás megsz nésének kezelésére a gyógyszerkészítmény nem alkalmas.

Gyermekkorban kell klinikai tapasztalat hiányában a készítmény nem szedhet .

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek

Feltétlenül tájékoztassa kezel orvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereir l, beleértve a vénynélkül kapható készítményeket is. Más gyógyszerrel egyidej leg csak orvosi utasításra szedhet , mivel a gyógyszerek hatása módosulhat az együttes alkalmazás során.

Terhesség és szoptatás

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer szedése előtt beszéljen kezelő orvosával vagy gyógyszerészével.

A Rowatinex cseppek a terhesség első harmadában és szoptatás ideje alatt nem szedhetők.

3. HOGYAN KELL SZEDNI A ROWATINEX CSEPPEKET?

A Rowatinex cseppeket mindig az orvos által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény ajánlott adagja felnőtteknek naponta 4-5-ször 3-5 csepp, étkezés előtt fél órával (kevés cukorra cseppentve).

Vesegőrcsben 20-30 csepp ajánlott, ami, ha szükséges, 20 perc múlva megismételhető.

Ha az előírtnál több Rowatinex cseppet vett beA túladagolás tünetei:

Az illóolajok nagy adagban a központi idegrendszer működését gátolják, ami légzési elégtelenséghez, bódultsághoz, a görcskészség fokozódásához vezethet. A gyomor ingerlésével émelygést, hányást, hasmenést idézhet elő.

Mi a teendő a túladagolás esetén?

Gyomormosás, tüneti kezelés javasolt. A szív-, légzés-, vese- és májfunkció ellenőrzése ajánlott.

Ha elfelejtette bevenni a Rowatinex cseppeket

Ne vegyen be dupla adagot az elfelejtett cseppek pótlására.

A következő adagot vegye be a megszokott időpontban.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Rowatinex cseppek is okozhatnak mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Ritkán enyhe és átmeneti gyomorpanaszok, hányás gyomorégés előfordulhat.

Esetenként kámforszerű utóíz érzés tapasztalható.

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelő orvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

5. HOGYAN KELL A ROWATINEX CSEPPEKET TÁROLNI?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A csomagoláson feltüntetett lejárati idő (Felhasználható) után ne szedje a Rowatinex cseppet.

A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaznak a Rowatinex cseppek

- A készítmény hatóanyagai: a Rowatinex cseppek 1 grammjában (=38 csepp): 30 mg cineol, 40 mg fenkon, 40 mg anetol, 100 mg borneol, 150 mg camfén, 310 mg alfa és béta pinén.
- Egyéb összetevők: a Rowatinex cseppek 1 grammjában: 330 mg olívaolaj.

Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás

10 ml olaj garanciazáras, csavaros alumínium kupakkal lezárt barna üvegben. Az üveg és egy fehér, HDPE csavaros kupak szintelen, LDPE cseppentő betéttel cseppentő dobozban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Rowa Pharmaceuticals Ltd., Bantry, Írország

Gyártó:

Rowa Pharmaceuticals Limited
Bantry, Co. Cork, Írország

OGYI-T-7612/01

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2011. december